

FLOXACINE®



MARBOFLOXACINA

SOLUCIÓN INYECTABLE

Antimicrobianos

FORMULA:

Cada mL contiene:

Marbofloxacina 100 mg

Vehículo cbp 1 mL

Contenido neto: Un frasco con 100 ml

USO VETERINARIO:



Antibiótico.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

Leer el instructivo antes de usar. FLOXACINE. Es un antibiótico bactericida de amplio espectro, se indica para tratar enfermedades respiratorias en bovinos causadas por: *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* y *Mycoplasma bovis*; en porcinos afectados por: *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Haemophilus parasuis*; mastitis aguda en vacas productoras de leche causada por *Escherichia coli*; en cerdas para tratar el síndrome mastitis, metritis, agalactia (MMA) por *Escherichia coli* e infecciones de aparato gastrointestinal en lechones, producidas por *Escherichia coli*.

DOSIS:

Bovinos:

Infecciones del aparato respiratorio: 2 mg/ kg /día (1 ml/50 kg /día) vía SC o IM durante 3 a 5 días.

Mastitis aguda: 2 mg/kg /día (1 ml/50 kg /día) vía SC o IM durante 3 días. La primera aplicación puede ser vía IV.

Porcinos: 2 mg/kg /día (1 ml/50 kg /día) vía IM durante 3 días.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: Subcutánea, intravenosa o intramuscular.

Porcinos: Intramuscular.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase de la luz.
- No se deje al alcance de niños y animales domésticos.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-275

PERÍODO DE RETIRO:

- El sacrificio de bovinos destinados al consumo humano debe esperar, por lo menos 6 días posteriores a la última administración del producto.
- El sacrificio de porcinos destinados al consumo humano debe esperar, por lo menos 4 días posteriores a la última administración del producto.
- La leche de vacas tratadas con este producto no deberá utilizarse para consumo humano; sino es de ordeñas posteriores a las 36 horas de la última aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

- Se contraíndica en pacientes con hipersensibilidad a la Marbofloxacina y otras quinolonas.
- No utilizar en casos de sospecha o resistencia confirmada a las fluoroquinolonas.

Salud animal
Bienestar humano®