

# FURACINE® NF



## FLORFENICOL

Preparados de uso externo Dermatológico Antimicótico

### FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Florfenicol	0.6 g
Vehículo cbp	100.0 ml

**Contenido neto:** 500 ml  
3.5 litros

### USO VETERINARIO:



### CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del médico veterinario.

### INDICACIONES:

Furacine NF es una solución con acción antimicrobiana de amplio espectro, lista para usarse en cerdos, bovinos (carne y leche), equinos, caninos y felinos en el tratamiento de: 1) infecciones del tracto genital y problemas de la fertilidad disminuida en las hembras de grandes especies, cuando dichos trastornos son causados por cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Streptococcus suis*, *Klebsiella* spp., *Arcanobacterium* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pseudomonas* spp. o *Campylobacter jejuni* var fetus (antes llamada *Vibrio foetus*) entre otras, sensibles a la acción de los componentes de la formulación; 2) para la prevención o control de infecciones bacterianas superficiales de la piel.

### DOSIS:

Tratamiento: Administrar en bovinos, equinos, porcinos de 30 a 90 ml y en caninos y felinos administrar de 15 a 20 ml directamente en el útero del animal, por medio de una pipeta o jeringa con cánula 1 vez al día por 3 a 5 días. En heridas de la piel se puede utilizar directamente una cantidad suficiente sobre la herida después de haber realizado la limpieza y lavado de la misma.

Instrucciones de uso:

En infecciones bacterianas superficiales: aplicar la solución directamente sobre la herida o lesión. Para apósitos húmedos, puede diluirse con dos o tres partes de agua estéril o con solución salina fisiológica y aplicarse varias veces al día o dejarse un vendaje humedecido con la solución.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica o Intrauterina.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-185

### ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de heridas punzantes o quemaduras severas, úsele únicamente de acuerdo a las recomendaciones del Médico Veterinario.
- Si el enrojecimiento o inflamación persisten o aumentan, descontinúese la aplicación y consulte nuevamente al Médico Veterinario.
- Suspender el tratamiento 5 días en cerdos y 6 días en vacas antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano.
- No produce problemas de toxicidad en humanos, ni residuos en animales.
- Se recomienda utilizar equipo de protección personal (Guantes y cubre bocas).

Salud animal  
Bienestar humano®