

Pentobarbital sódico

Solución Inyectable

Neurotrópicos y anestésicos

FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Pentobarbital sódico 6.3 g

Vehículo cbp 100 ml

Contenido neto: Un frasco con 100 ml

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del médico veterinario.

INDICACIONES:

PISABENTAL: De acuerdo a la dosis puede actuar como sedante y anestésico general en caninos y felinos. Se recomienda como sedante y anestésico en bovinos adultos. Se puede utilizar como anestésico en terneros, ovejas y cerdos adultos.

DOSIS:

En perros:

Sedante: 2 a 4 mg/kg de peso corporal.

Anestésico: 10 a 30 mg/kg de peso corporal a efecto.

En gatos:

Sedante: 2 a 4 mg/kg de peso corporal.

Anestésico: 25 mg//kg de peso corporal, adicionalmente se puede administrar 10 mg/kg si la dosis inicial no fue la adecuada.

En eutanasia de perros y gatos se sugiere utilizar de dos a tres veces la dosis máxima recomendada como anestesia.

Como sedante en bovinos adultos administrar de 1 a 2 gramos hasta observar que el animal muestra desequilibrio.

Como anestésico en:

Bovinos y cerdos adultos: 30 mg/kg de peso corporal a efecto.


Terneros: 15 a 30 mg/kg de peso corporal.

Ovejas: la dosis promedio se encuentra entre los 11 a 54 mg/kg de peso corporal, la cual debe ser administrada a efecto, se puede administrar 5 mg/kg de peso para mantener el efecto anestésico.

El producto deberá administrarse en forma lenta y gradual hasta conseguir el efecto deseado, observando constantemente el reflejo palpebral.

VIA DE ADMINISTRACION:

Intravenosa. Aplíquese lentamente.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-215

ADVERTENCIAS:

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria

-No se deje al alcance de los niños.

-Consérvese a temperatura ambiente y protéjase de la luz.

-No se administre este producto en cesáreas por su acción depresiva del aparato respiratorio, afectando al recién nacido.

-No se administre en forma perivascular, por que los tejidos blandos se pueden irritar.

-En caso de sobredosis, ventilar y administrar solución salina de picrotoxina a 0.03% a razón de 1 a 1.5 ml por cada 5 kg de peso corporal, por vía intravenosa, repetir cada hora hasta que los reflejos se normalicen.