

FORMULA:

El frasco ampula con polvo contiene:

Penicilina G sódica	1, 000,000 U.I.
Penicilina G procaínica	3, 000,000 U.I.
Estreptomicina sulfato equivalente a de estreptomicina base	5.0 g

La ampolleta con diluyente contiene:

Agua inyectable	10 ml
-----------------	-------

Contenido neto: Frasco ampula con polvo
4 millones de U.I. y ampolleta
con diluyente de 10 ml

PENBALEX Polvo

Reg. SAGARPA
Q-7833-079

USO VETERINARIO

Combinación antibiótica

Penicilina G Sódica, Penicilina G Procaínica
y Estreptomicina

CONSULTE AL MEDICO
VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

SUSPENSION INYECTABLE

LOTE No:

(LOGO PiSA ® AGROPECUARIA)
®Marca Registrada

FECHA DE CADUCIDAD:

Registros en otros países:

HECHO EN MEXICO PARA:
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.
Calle 1 Norte, Manzana 2-25
Parque Industrial Tula
Atitalaquia, Hgo.

INDICACIONES:

Penbalex Polvo: es una combinación antibiótica de amplio espectro que se usa en bovinos (productores de carne y leche), equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos y que está indicada para el control y tratamiento de todas las infecciones ocasionadas por las bacterias susceptibles a la acción de penicilina y estreptomicina que ocasionan enfermedades como: mastitis, metritis, neumonías, pasteurelosis, pododermatitis necrótica (gabarro), abscesos. En vacas favorece la involución uterina post-partum; en cerdas es coadyuvante para prevenir y tratar el Síndrome Mastitis Metritis Agalactiae (S.M.M.A.).

DOSIS:

En bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, caninos y felinos es de 10,000 a 20,000 U.I. por kg de peso (de 4 a 8 ml por cada 100 kg) durante 3 días a juicio del Médico Veterinario.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

ADVERTENCIAS:

- Este es un producto veterinario, no apto para el uso en humanos.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Una vez reconstituido, puede conservarse en refrigeración entre 2°C y 8°C hasta 3 días.
- No usar en animales hipersensibles a la penicilina o estreptomicina. No administrar 30 días antes del sacrificio.
- No utilizar para consumo, la leche procedente de los animales tratados con éste producto, hasta 4 días después de la última aplicación.
- No utilizar este producto en equinos destinados al consumo humano.