

FURACINE® NF

N° de Registro: Q-7833-201

Ungüento antimicrobiano

DESCRIPCIÓN:


FURACINE® NF es una pomada con acción antimicrobiana de amplio espectro, se indica para la prevención o control de infecciones superficiales de la piel como heridas, quemaduras y úlceras cutáneas causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas sensibles a la acción del florfenicol, en caballos, bovinos (productores de carne y leche), cerdos, aves (pollitas de reemplazo), perros y gatos.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Florfenicol	0.6 g
Vehículo cbp	100.0 g

ESTRUCTURA QUÍMICA:



Florfenicol

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

El nombre químico del florfenicol es (d-tre-2,2-dicloro-N-c-alfa-(fluormetilo)-betahidroxi-p-(fenetilo)acetamida. Es un fármaco liposoluble y con un espectro de acción amplio mayor que sus análogos (tianfenicol y cloranfenicol).

MECANISMO DE ACCIÓN:

Florfenicol actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana al unirse a las subunidades ribosomales de la fracción 50s. El Florfenicol ataca la enzima peptidil transferasa evitando la transferencia de aminoácidos en la formación de cadenas peptídicas y la subsecuente formación de proteínas.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar **FURACINE® NF** directamente sobre la lesión con una espátula o sobre una gasa para ser aplicada sobre la herida. En el caso de aves, se recomienda utilizarlo inmediatamente después del despique hundiendo el pico en **FURACINE® NF**. En otras especies, el uso de vendaje es opcional. **FURACINE NF** deberá permanecer sobre la lesión por lo menos durante 24 horas. El vendaje puede cambiarse varias veces al día o dejarse sobre la lesión durante un período mayor. **FURACINE NF** puede dejarse sobre la herida recién suturada, ya que por ser soluble en agua, no interfiere en la cicatrización.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

DOSIFICACIÓN:

Una vez al día por 3 a 5 días, lo cual puede ser modificado a criterio del Médico Veterinario, y en aves una sola vez al despique.

EFFECTOS ADVERSOS:

Debido a su presentación y vía de administración, no se espera que se presenten efectos adversos sistémicos, ya que no penetra la piel intacta.

Si el enrojecimiento o inflamación persisten o aumentan, descontinúese la aplicación y consulte nuevamente al Médico Veterinario.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

En caso de heridas punzantes o quemaduras severas, úsese únicamente de acuerdo a las recomendaciones del Médico Veterinario.





Salud
Animal

FICHA TÉCNICA

Preparados de uso externo

Cuando se use sobre abscesos, deberá aplicarse únicamente después de la incisión, ya que no penetra la piel intacta.

ADVERTENCIA:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No se deje al alcance de los niños.
- No administrar este producto en equinos destinados al consumo humano.

PRESENTACIONES:

Tubo con 85 g.
Tarro con 453g.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista
Información exclusiva para Médicos Veterinarios Zootecnistas.

La presentación de cualquier reacción adversa deberá de reportarse a la Unidad de Farmacovigilancia Veterinaria de PiSA Agropecuaria.

Responsables del contenido:

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

