

**RABCHOICE®**

No. de Registro: B-7833-396

**DESCRIPCIÓN:**

**RABCHOICE®** es una vacuna a base de virus inactivado para la inmunización de la rabia en perros y gatos sanos.

**FÓRMULA:**

Cada mL contiene:

Antígeno antirrábico (cepa Pasteur) inactivado	≥ 1 UI
Gel de hidróxido de aluminio	5%
Excipiente c.s.p.	1 mL

**INDICACIONES TERAPEUTICAS:**

Se indica para la inmunización activa en perros y gatos clínicamente sanos, para prevenir la infección y reducir la mortalidad causadas por el virus de la rabia.

**DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:**

Para perros y gatos a partir de los 3 meses, independientemente de la talla, deberá administrarse 1 mL por vía SC o IM por animal, revacunando de forma anual.

**EFFECTOS ADVERSOS:**

En muy raras ocasiones se observaron reacciones de hipersensibilidad tales como: signos a nivel sistémico (edema, letargia, prurito, urticaria, hipertermia), digestivo (emesis, hipersalivación, diarrea) y respiratorio (disnea) después de la vacunación. En estos casos debe administrarse un tratamiento sintomático.

En raras ocasiones, después de la administración por vía S.C., se puede observar un nódulo temporal y/o dolor en el sitio de inyección.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA:**

Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y VACUNAS:**

No mezclar nunca con ningún otro antígeno o medicamento en la misma jeringa.

No existe evidencia que comprometa la eficacia de la vacuna al administrarse con otros antígenos. Sin embargo, se recomienda aplicar en distintas zonas anatómicas para diferenciar el causante en caso de existir reacciones locales.

La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

**RECOMENDACIONES:**

**RABCHOICE®** como cualquier otro antígeno, inducirá a una respuesta inmune específica en el animal siempre y cuando se encuentre en un estado de salud favorable. Para esto, el paciente deberá de ser examinado a detalle para descartar cualquier patología.

Se recomienda realizar una desparasitación integral previo a la aplicación de cualquier antígeno para garantizar una respuesta inmune de calidad.

Antes de aplicar la vacuna, se recomienda realizar una limpieza en la zona de aplicación. No se recomienda el uso de alcohol.

**CONTRAINDICACIONES:**

No administrar en animales con algún proceso patológico, ya que esto puede comprometer la eficacia de la vacuna.



**ADVERTENCIAS:**

- Mantenerse en temperatura de 2-8°C hasta el momento de la aplicación en el animal.
- No congelar.
- Utilizar siempre jeringas y agujas nuevas y estériles.
- Producto de uso exclusivo en animales, no se use en humanos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista (Información exclusiva para Médicos Veterinarios Zootecnistas).

*La presentación de cualquier efecto adverso deberá de ser reportado a la Unidad de Farmacovigilancia de PiSA Salud Animal.*

**Responsables del contenido:**

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica

**PRESENTACIÓN:** Vial unidosis de 1 mL, en blíster de 50 dosis.

