

VODEXAT® FLUT
N° de Registro Q-7833-337

Antiinflamatorio esteroideo

DESCRIPCIÓN


VODEXAT® FLUT está indicado en todas aquellas afecciones musculares esqueléticas donde exista inflamación, así mismo en aquellas inflamaciones que involucren una infección siempre y cuando se combine con el antibiótico indicado.

VODEXAT® FLUT también está indicado en los trastornos metabólicos en donde la glucosa circulante baja (cetosis), y gracias a su efecto gluconeogénico, está recomendado en los casos de estrés y shock debido a que en estos procesos existe gasto de energía.

FÓRMULA

Cada ml contiene:

Flumetasona	0.5 mg
Excipiente c.b.p.	1 mL

ESTRUCTURA QUÍMICA

MECANISMO DE ACCIÓN

La flumetasona es un glucocorticoide de acción prolongada (~48hrs) que actúa inhibiendo la producción

de ácido araquidónico y por tanto la producción de nuevos mediadores de la lipooxigenasa y ciclooxigenasa.

FARMACODINAMIA

La distribución se amplía a todos los tejidos.

Se metaboliza en el hígado y los metabolitos inertes solubles son eliminados vía renal.

INDICACIONES

VODEXAT® FLUT se indica al igual que otros corticosteroides, para el tratamiento de una variedad de enfermedades inflamatorias e inmunitarias. Incluyendo el tratamiento de afecciones inflamatorias, especialmente trastornos musculoesqueléticos y articulares. En caballos, flumetasona se ha utilizado para el tratamiento de la obstrucción recurrente de las vías respiratorias (OVR) y en el ganado productor de carne se ha utilizado en el tratamiento de la cetosis.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Equinos:

Aplicar de 1.25 a 2.5 mg por animal como dosis única IM o IV, equivalente de 2.5 a 5 mL dosis total por equino.

Perros:


Aplicar de 0.06 a 0.25 mg por perro por día IM, IV o SC, equivalente de 0.12 a 0.5 mL dosis total por perro.

Bovinos productores de carne:

Aplicar de 1.25 a 5 mg/animal como dosis única IV o IM, equivalente de 2.5 a 10 mL dosis total por Bovino.

Gatos:

Aplicar de 0.03 a 0.125 mg por gato por día IM, IV o SC, equivalente de 0.06 a 0.25 mL dosis total por gato.



CONTRAINDICACIONES

No administrar a pacientes con hipersensibilidad conocida a la flumetasona.

No combinar con antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No se recomienda el uso de glucocorticoides en etapas en desarrollo. El uso durante estas etapas debe ser de acuerdo con la evaluación riesgo/beneficio del médico veterinario responsable.

EFFECTOS ADVERSOS

De aplicarse por vía parenteral, a los animales gestantes pueden inducir la primera etapa del parto cuando se administran durante el último trimestre del embarazo y pueden precipitar un parto prematuro seguido de distocia, muerte fetal, placenta retenida y metritis.

ADVERTENCIAS

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños o animales domésticos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- Usar con precaución en pacientes propensos a úlceras o infecciones y en animales en los que es necesaria la cicatrización de heridas.
- Usar con precaución en animales con insuficiencia renal o diabetes.
- Este producto está contraindicado en la etapa de gestación.
- No usar en caballos destinados al consumo humano.

PERIODO DE RETIRO

Este producto tiene un tiempo de retiro en Bovinos productores de carne es de 4 días antes del sacrificio para el consumo humano.

PRESENTACIÓN

Frasco de 50 mL

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura de 15° C a 30°C en un lugar fresco.

Almacenar protegido de la luz.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista (Información exclusiva para Médicos Veterinarios Zootecnistas).

Cualquier presentación de reacción adversa deberá reportarse a la Unidad de Farmacovigilancia Veterinaria de PiSA Salud Animal.

RESPONSABLES DEL CONTENIDO:

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

