

La vida media de eliminación terminal es de aproximadamente 15 horas.

Los niveles plasmáticos de maropitant confirieron eficacia desde 1 hora después de la administración. La biodisponibilidad de maropitant después de la administración subcutánea es de 100%.

Maropitant sufre un metabolismo del citocromo P450 (CYP) en el hígado. Las enzimas relacionadas con CYP1A y CYP3A se identificaron como las isoformas felinas implicadas en la biotransformación hepática de maropitant.

Maropitant se elimina principalmente por el hígado. Los aclaramientos fecales y renales son vías de eliminación menores para maropitant, con menos de 1% de una dosis subcutánea de 1 mg/kg que aparece en la orina o las heces como maropitant. Para el metabolito principal, el 10.4% de la dosis de maropitant se recuperó en la orina y el 9.3% en las heces. La unión a proteínas plasmáticas de maropitant en gatos es de 99.1%.

INDICACIONES:

SECRETIAR se indica en perros y gatos para el tratamiento de náuseas y vómitos. Se recomienda su uso en perros mayores 8 semanas de edad, así como en gatos mayores de 16 semanas de edad.

DOSIS:

Perros: Dosis general de 1 mg/kg, equivalente a 1 mL por cada 10 kg de peso corporal, cada 24 horas, hasta por 5 días consecutivos.

Gatos: Dosis general de 1 mg/kg, equivalente a 0.5 mL por cada 5 kg de peso corporal, cada 24 horas, hasta por 5 días consecutivos.

El uso de **SECRETIAR** a temperatura de refrigeración puede reducir la respuesta dolorosa asociada con la inyección.

Para prevenir los vómitos, **SECRETIAR** debe administrarse con más de una hora de antelación.

La duración del efecto es de aproximadamente 24 horas, por lo que, el tratamiento puede administrarse la noche previa a la administración de un agente que pueda producir emesis.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en perros de menos de 8 semanas o en gatos de menos de 16 semanas de edad; no administrar durante la etapa de gestación y/o lactancia, ya que no se han establecido la seguridad de maropitant en estos casos.


REACCIONES SECUNDARIAS:

Puede producir dolor transitorio y/o inflamación en el sitio de inyección. En gatos, es muy común observar una respuesta a la inyección de moderada a grave.

En muy raras ocasiones, pueden ocurrir reacciones de tipo anafiláctico (edema alérgico, urticaria, eritema, colapso, disnea, membranas mucosas pálidas).

PRECAUCIONES:

- El producto debe emplearse dentro de los 28 días después de perforar por primera vez el tapón.
- La solución inyectable no debe mezclarse con otros medicamentos en la misma jeringa.
- Debido a la acumulación después de dosis repetidas, el medicamento no se debe administrar durante más de 5 días consecutivos y se debe permitir un período de espera de 2 días antes de comenzar con otro ciclo de tratamiento.
- Maropitant se metaboliza en el hígado, por lo tanto, debe usarse con precaución en animales con alteraciones hepáticas.
- Debe usarse con precaución en animales que padecen o tienen predisposición a enfermedades cardíacas, ya que maropitant



tiene afinidad por los canales iónicos de calcio y potasio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Los vómitos pueden estar asociados con afecciones graves y severamente debilitantes, que incluyen obstrucciones gastrointestinales; por lo tanto, se deben emplear evaluaciones diagnósticas apropiadas.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a maropitant deben administrar el medicamento con precaución.
- Lávese las manos después de usar.
- En caso de auto-inyección accidental, consulte inmediatamente a un médico y muéstrela la etiqueta del medicamento.
- La exposición tópica puede provocar reacciones cutáneas alérgicas localizadas en algunas personas.
- En caso de exposición accidental a la piel, lavar con agua y jabón. La exposición repetida o prolongada puede conducir a la sensibilización de la piel.
- En estudios de laboratorio, maropitant ha demostrado ser un potencial irritante para los ojos. En caso de exposición accidental, lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos y acudir a recibir atención médica.
- La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica porque su uso está limitado a mascotas no destinadas al consumo humano.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Maropitant no debe usarse junto con bloqueantes de los canales de calcio, ya que tiene afinidad por los canales de calcio.

Maropitant se une fácilmente a las proteínas plasmáticas y puede competir con otros fármacos que también tienen alta afinidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto a temperatura ambiente a no más de 30°C.

PRESENTACIÓN:

Caja con un frasco con 20.0 mL.

Cualquier presentación de Reacción Adversa debe reportarse a la Unidad de Farmacovigilancia Veterinaria de PiSA Agropecuaria.

Responsables del contenido:

Departamento Técnico, PiSA Agropecuaria S.A. de C.V.

